

FERTILIZANTES FOLIARES Y/O RADICULARES – BIOESTIMULANTES
MAXIFRUT®

INGREDIENTE ACTIVO NOMBRE QUIMICO GRUPO QUIMICO CONCENTRACION Y FORMULACION	Macro - Micro nutrientes y Aminoácidos. Macro - Micro nutrientes minerales y Aminoácidos Nutrientes orgánicos e Inorgánicos y Aminoácidos K 28,7% p/v; P 21,6% p/v; B 0,90% p/v; Fe 0,04% p/v; Mn 0,03% p/v; Cu 0,001% p/v; Zn 0,002% p/v; Aminoácidos 69 g/L SL (Concentrado soluble)
MODO DE ACCION	Nutriente-Bioestimulante para cuajado y engorde de frutos.
FABRICANTE/FORMULADOR DISTRIBUIDOR EN CHILE	VELLSAM S.A. – España AGROCONNEXION LTDA.
TOXICIDAD ANTIDOTO	No corresponde No corresponde

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Vides con semilla	2 – 3	Aplicar en pre floración y repetir en plena flor.
Carozos	2 – 3	Para cuaja realizar 3 aplicaciones, en prefloración floración y caída de pétalos. Para engorde realizar aplicaciones cada 20 días desde fruto cuajado.
Manzanos Perales	2 – 3	Realizar 3 aplicaciones, en prefloración floración y caída de pétalos. Para engorde realizar aplicaciones cada 20 días desde fruto cuajado.
Palto Cítricos Olivos	2 – 3	Para cuaja aplicar cada 12 – 15 días desde inicio de floración. Para engorde realizar aplicaciones cada 20 días desde fruto cuajado.
Arándanos Frambuesas Frutillas	2 – 3	Para cuaja aplicar cada 12 – 15 días desde inicio de floración. Para engorde realizar aplicaciones a intervalos 20 días a partir de fruto cuajado.
Kiwi	2 – 3	Realizar 3 aplicaciones, en prefloración, floración y caída de pétalos. Para engorde realizar aplicaciones cada 20 días desde fruto cuajado.
Tomate	200-300 cc/hL	Para cuaja aplicar junto con hormona de cuajado, repetir cada seis días mientras haya flores. Para engorde realizar aplicaciones cada 20 días desde fruto cuajado.

CARENCIA

No corresponde

PRECAUCIONES

No necesarias

COMPATIBILIDAD

Con todos los productos

SUSCEPTIBILIDAD VARIETAL

Ninguna

® Marca Registrada de AGROCONNEXION LTDA.