

## **TERRA-SORB® COMPLEX**

**INGREDIENTE ACTIVO**

Aminoácidos libres, Boro, Magnesio, Hierro, Zinc, Manganeso, Molibdeno y Materia orgánica.

**NOMBRE QUIMICO**

L alfa Aminoácidos

**GRUPO QUIMICO**

L alfa Aminoácidos

**CONCENTRACION**

Aminoácidos libres 200 g/L Totales: 250 g / L

Boro 1,5 g/L ; Magnesio 0,8 g/L; Hierro 1,0 g/L;

Zinc 0,1 g/L; Manganeso 0,1 g/L; Molibdeno 0,001 g/L

Materia orgánica 35 g/L.

**FORMULACION**

SL (Concentrado soluble)

**MODO DE ACCION**

Bioestimulante para plantas

**FABRICANTE/FORMULADOR**

BIOIBERICA S.A. ESPAÑA

**DISTRIBUIDOR EN CHILE**

AGROCONNEXION LTDA

**TOXICIDAD**

No corresponde

**ANTIDOTO**

No corresponde

**INSTRUCCIONES DE USO**

Cultivo	Dosis (L/ha)	Época	Objetivo
OLIVO	2 – 3	Inicio brotación Prefloración Fruto recién cuajado	Mayor brotación Aumenta la cuaja Aumenta producción
FRUTALES	3	Antes de floración Caída de pétalos Pre- endurecimiento carozo	Aumenta cuajado Aumenta calibre
VID	2 – 3	Fruto cuajado En cada aplicación de ac. giberélico En pre- pinta	Induce precocidad Aumenta calibre Aumenta producción Uniforma período cosecha
BERRIES	2-3	Floración Fruto recién cuajado Crecimiento del fruto	Aumenta cuajado Aumenta calibre
PALTO CHIRIMOYO	1 2 – 3	A inicio de flor 30 días después de flor 60 días después de flor	Aumenta la cuaja Anticipa la cosecha Aumenta producción Mayor resistencia a heladas
PAPAS CEBOLLAS LECHUGAS	3 – 6 2 – 3	Desde 2 a 3 hojas repitiendo cada 20 días	Mayor desarrollo vegetativo Uniforma calibre Incrementa producción Recupera de estrés
HORTALIZAS	2 – 3	Con 4 a 5 hojas Primera flor	Aumenta cuajado Aumenta calibre

**CARENCIA**

No tiene

**PRECAUCIONES**

No necesarias

**COMPATIBILIDAD**

Con todos los productos

**SUSCEPTIBILIDAD VARIETAL**

Ninguna

® Marca Registrada de BIOIBERICA S.A. (Empresa certificada, ISO 9001:2000, ISO 14001).