

Terra-Sorb® complex

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FERTILIZANTE FOLIAR	
Categoría	Fertilizante líquido con acción bioestimulante
Modo de acción	Aminoácidos de acción sistémica
Formulación	Concentrado soluble (SL)
Fabricante/formulador	BIOIBERICA S.A. – ESPAÑA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA
Toxicidad	Producto que no ofrece peligro

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	
ELEMENTO	% P/P
Aminoácidos libres*	20
Nitrógeno total	5,5
Nitrógeno orgánico	5
Boro	1,5
Hierro complejado	1
Manganeso	0,1
Molibdeno	0,001
Zinc	0,1

PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
pH	6
Densidad a 20° C	1,3 g/mL
Solubilidad en Agua	100%

*L-α-aminoácidos con pureza sobre 98%

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Terra-Sorb® complex aporta una elevada concentración de L-α-aminoácidos libres procedentes de hidrólisis enzimática. También incorpora oligoelementos que activan numerosos procesos fisiológicos y enzimáticos. La adición al formulado de microelementos contribuye a un mejor equilibrio nutricional, sin ser un corrector de carencias.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos. En aplicaciones con compuestos cúpricos, azufre o aceites, se recomienda no sobrepasar la dosis de 100 mL por 100 litros de agua.

Precauciones

Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

Presentación

5 y 20 L



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA	OBJETIVO
Frutales	3 L/ha	Antes de floración Caída de pétalos Pre-endurecimiento carozo	Aumenta cuajado Promueve el tamaño del fruto
Vid de mesa y Vinífera	2 – 3 L/ha	Fruto cuajado En cada aplicación de ácido giberélico En pre-pinta	Induce precocidad Promueve el tamaño de la baya Aumenta producción Uniforma período cosecha
Berries		Floración Fruto recién cuajado Crecimiento del fruto	Aumenta cuajado Promueve el tamaño del fruto
Palto Chirimoyo		Al inicio de flor 30 días después de flor 60 días después de flor	Aumenta la cuaja Anticipa la cosecha Aumenta producción Mayor resistencia a heladas
Olivo		Inicio brotación Pre-floración Fruto recién cuajado	Mayor brotación Aumenta la cuaja Aumenta producción
Papas Cebollas Lechugas		Desde 2 a 3 hojas repitiendo cada 20 días	Mayor desarrollo vegetativo Uniforma calibre Incrementa producción Recupera de estrés
Hortalizas		Con 4 a 5 hojas Primera flor	Aumenta cuajado Promueve calibre

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.