Agro Connexion®
Nutrición - Biodefensa - Estrés

exilis®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FITORREGULADOR	
Ingrediente activo	6 – Benciladenina
Modo de acción	Fitorregulador de acción sistémica
Formulación	Concentrado soluble (SL)
Fabricante/formulador	FINE AMERICAS, INC. – EE.UU.
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA
Toxicidad	IV: Producto que normalmente no ofrece peligro
Autorización SAG	N° 4.234

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
6 – Benciladenina	2,12% p/v (21,2 g/L)
Coformulantes, c.s.p.	100% (1 L)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Exilis® es un fitorregulador para raleo de post floración de manzanos y perales que mejora el tamaño de frutos y su calidad. Ralea selectivamente los frutos más débiles, conservando los de mayor potencial de crecimiento.
Además, Exilis® es un excelente promotor de crecimiento de frutos de manzanos, olivos, paltos, uva de mesa y cítricos, cuando se aplica entre pre-floración y las primeras etapas de desarrollo de frutos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad
Compatible con tensioactivos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

Carencia
No tiene.

Reingreso al área tratada
Se puede reingresar al área tratada cuando se haya secado la aplicación sobre el follaje, aproximadamente 12 horas después. No tiene restricciones para el reingreso de animales.

Precauciones
Almacenar en lugar fresco y seco, lejos de alimentos, semillas u otros productos. Mantener fuera del alcance de niños y personas inexpertas.

Presentación
10 L

® Marca Registrada de FINE AMERICAS, INC.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	OBJETIVO	DOSIS	OBSERVACIONES
Manzanos y Perales	Raleo	6 – 12 L/ha	Realizar 1 o 2 aplicaciones cada 7–10 días en fruto rey de 5 a15 mm de diámetro. Usar un mojamiento de 1.200 L/ha.
Manzanos	Aumento de tamaño de frutos	0,6 – 3 L/ha	Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 3–10 días. Aplicar desde caída de pétalos con un mojamiento de 1.200 L/ha.
Olivos	Promotor de crecimiento	1,5 – 2,3 L/ha	Aplicar cuando las panículas están en su fase de expansión con inicio de floración. Utilizar la dosis menor en casos de baja floración y la mayor en casos de floración alta. Aplicar con mojamiento de 1.000 L/ha. Realizar un máximo de una aplicación por temporada.
Paltos	Promotor de crecimiento	1,9 L/ha	Aplicar en periodo de pre-floración cuando las panículas están en pleno desarrollo (10% de las panículas más adelantadas presenten un brote vegetativo no mayor a 5 cm). Aplicar con mojamiento de 2.000 L/ha. Realizar un máximo de una aplicación por temporada.
Uva de mesa (Red Globe y Crimson seedless)	Promotor de crecimiento	340 cc/ha en cada aplicación	Aplicar cuando el 100% de los racimos estén con la cuaja definida, (Red Globe 8-10 mm, 12-14 ó 18 -20 mm), (Crimson seedless 6-8 mm y 10-12 mm). La aplicación debe ser dirigida a los racimos con un mojamiento de 600 L/ha. Con electroestática usar 100 L/ha. Realizar máximo 2 aplicaciones por temporada cada 7 días.
Cítricos (Mandarinos, Clementinos, Naranjos y Limoneros)	Aumento de tamaño de frutos	2,0 L/ha	Realizar 3 aplicaciones en la temporada: botón floral, plena flor y desde cuaja a inicios de crecimiento de frutos. Aplicar con un mojamiento de 1.500 – 2.000 L/ha.

Recomendaciones de uso
No aplicar con pH del agua 8,0 o superior. De ser necesario, se recomienda el uso de INDICATE-5® para bajar el pH de la mezcla a 5 – 6,5.
Es compatible en mezcla con un tensioactivo para mejorar el cubrimiento de la aplicación.
Al realizar la mezcla y durante la aplicación mantener el agitador de la nebulizadora en constante funcionamiento.

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl