

Iniciium®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MEZCLA	
Modo de acción	Péptidos y nutrientes minerales de acción sistémica
Formulación	Concentrado soluble (SL)
Fabricante/formulador	BIOIBERICA S.A. – ESPAÑA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA			PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
ELEMENTO	% p/p	% p/v		
Materia orgánica	40,0	52,00	pH	4,2
Carbono orgánico	25,0	35,53	Densidad a 20° C	1.303 g/L
Aminoácidos libres	14,0	18,20	Solubilidad en Agua	100%
Nitrógeno total	5,7	7,42		
Nitrógeno orgánico	4,6	5,99		
Nitrógeno amoniacal	1,1	1,43		
Anhídrido fosfórico (P ₂ O ₅)	5,6	7,31		

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Iniciium® es un formulado especialmente elaborado como iniciador de la actividad radicular, desarrollando un potente aparato radicular (raíz y pelos absorbentes). Mejora la producción y ayuda a superar efectiva y rápidamente las principales situaciones de estrés que se dan en el trasplante de un cultivo (estrés hídrico, térmico, lumínico, salino y diversas fisiopatías). Adelanta la evolución de los estados iniciales alcanzando el estado de floración con mayor rapidez, manteniendo en equilibrio la parte radicular y la parte aérea (relación raíz/hoja). Iniciium® posee una formulación innovadora en base a péptidos caracterizados de bajo peso molecular que activan las proteínas del estrés, gatillando así una rápida respuesta de adaptación en las plantas que están en sus etapas iniciales de activo crecimiento. Producto totalmente natural, libre de hormonas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos. No aplicar junto con enmiendas de guano. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

Precauciones

Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

Presentación

1, 5 y 20 L



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Plantines y almácigos	5 a 10 mL/L de agua	Realizar una a tres aplicaciones, desde cotiledón expandido, repitiendo cada siete días. Aplicar vía riego. En speedling regar con 0,5 a 1 litro por bandeja.
Hortícolas y frutilla	10 -15 L/ha por cada aplicación	Realizar dos aplicaciones, en el trasplante y siete días después. Aplicar en la última fase de riego. Con el primer riego de plantación y una semana después.
Frutales	Viveros: 10-20 mL/árbol Inicio de producción: 40-80 mL/árbol Plena producción: 60-120 mL/árbol	Aplicar al inicio de la actividad radicular por vía riego.

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl