



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

INSECTICIDA	
Ingrediente activo	Ciromazina
Modo de acción	Inhibidor de síntesis de quitina por contacto e ingestión
Formulación	Polvo mojable (WP)
Fabricante/formulador	FARMEX S.A. - PERÚ
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA
Toxicidad	IV: Producto que normalmente no ofrece peligro
Autorización SAG	N° 1679

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN QUÍMICA	
Ciromazina*	75 %p/p (750 g/Kg)
Coformulantes	25 %p/p (250 g/Kg)
* N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triamina	

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Magic® 75 WP es un insecticida regulador de crecimiento de insectos, recomendado para el control de dípteros del género *Liriomyza spp* (minahojas o minadores de hoja) que actúa por contacto e ingestión, inhibiendo la síntesis de quitina durante el proceso de muda de los estados inmaduros de insectos.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Compatibilidad

Compatible con la mayoría de pesticidas de uso agrícola de uso común, excepto los de reacción alcalina.

Reingreso al área tratada

El período de resguardo para el ingreso de personas es de 12 horas después de efectuada la aplicación.

Fitotoxicidad

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las instrucciones de uso de la etiqueta.

Precauciones

No fumar, comer o beber durante el uso de este producto. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Presentación

50 g



INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES	CARENCIA
Cebolla Remolacha Papa Tomate Pimentón Frejol Melón Sandía Zapallo Apio Lechuga Zanahoria	Minador de la chacras (<i>Liriomyza huidobrensis</i>) Minador de las hortalizas (<i>Liriomyza sativae</i>) Minador de la papa (<i>Liriomyza quadrata</i>)	125 g/ha	Aplicar cuando se observen las primeras minas en el follaje. Repetir a los 14 a 21 días después, sólo si se presenta una nueva infestación con presencia de minas en el follaje. Realizar máximo dos aplicaciones por temporada. Pulverización por vía líquida, empleando 400 a 600 L/ha de agua, que asegure una adecuada cobertura de todo el follaje de las plantas, evitando el escurrimiento al suelo.	Melón, sandía: 4 días. Lechuga: 14 días. Zapallo: 25 días. Otros cultivos: 7 días.

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.

WWW.AGROCONNEXION.CL • Teléfono: (02) 2202 59 44 • Mail: agro@agroconnexion.cl