

# KYTEX®

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MEZCLA	
Modo de acción	Corrector nutricional de acción sistémica
Formulación	Concentrado soluble (SL)
Fabricante/formulador	ADRIATICA SPA - ITALIA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA

## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA			PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS	
ELEMENTO	% p/p	% p/v		
Óxido de calcio (CaO)	6,5	9,30	pH	6,5
Óxido de potasio (K <sub>2</sub> O)	3,2	4,58	Densidad a 20° C	1.430 g/L
Óxido de magnesio (MgO)	1,2	1,72	Solubilidad en Agua	99%
Trióxido de azufre (SO <sub>3</sub> )	1,0	1,43		
Carbohidratos (disacáridos)	2,5	3,58		
Aminoácidos libres	1,5	2,15		
Carbono orgánico	3,0	4,29		
Nitrógeno orgánico	0,8	1,14		

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Kytex® es un formulado líquido de altísima pureza para aplicaciones foliares en todos los cultivos. Previene el estrés oxidativo de origen fisiológico producido por fenómenos ambientales extremos, como exceso de temperaturas y radiación.

Gracias a su acción osmoprotectora, sumado al aporte balanceado de Calcio, Potasio, Magnesio y Azufre, contribuye a la mitigación de los efectos negativos del estrés oxidativo en las plantas, reduciendo la incidencia de microlesiones y retardando los procesos de senescencia, como ablandamiento prematuro de frutos, pardeamiento y deshidratación de los tejidos tanto en la cosecha como en postcosecha de frutales y hortalizas.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos. Evitar mezclas con productos alcalinos, cobres y aceites minerales.

### Precauciones

Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

### Presentación

20 Kg



CULTIVO	DOSIS	RECOMENDACIONES
Vides de mesa y vinífera	4 – 6 Kg/ha por aplicación  Completar al menos 12 Kg/ha por temporada	2 a 3 aplicaciones en: - Pre-cierre de racimos. - Inicio de Pinta. - Pre-cosecha.
Cerezo		2 aplicaciones en: - Fruto de color pajizo. - 7 días después.
Arándano		3 a 5 aplicaciones en: - Cuaja. - Cada 7 a 15 días.
Durazno Nectarines		2 a 3 aplicaciones: - Crecimiento de frutos. - Inicio de pinta. - Pre-cosecha.
Manzano Peral		2 a 3 aplicaciones: - Pre-pinta. - Cada 15 días.
Palto Cítricos		2 a 3 aplicaciones previo a la época de mayor estrés por exceso de temperatura y/o déficit hídrico.
Hortalizas de fruto		2 a 3 aplicaciones en: -Cuaja / Crecimiento de fruto. -Pinta / Maduración. -Pre-cosecha.
Hortalizas de hoja		2 a 3 aplicaciones en: - 10-15 días después del trasplante. - Durante el crecimiento. - Pre-cosecha.

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.