



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FERTILIZANTE	
Modo de acción	Fertilizante para el cuajado y engorde de frutos
Formulación	Concentrado soluble (SL)
Fabricante/formulador	ADRIATICA SPA - ITALIA
Distribuidor en Chile	AGROCONNEXION SPA

## COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA			PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	
ELEMENTO	% p/p	% p/v	pH	8,8
Pentóxido de fósforo (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	16,0	22,40	Densidad a 20° C	1.400 g/L
Óxido de potasio (K <sub>2</sub> O)	21,0	29,40	Solubilidad en Agua	99%
Boro	0,05	0,07		
Cobre EDTA quelado	0,01	0,01		
Hierro EDTA quelado	0,02	0,03		
Manganeso EDTA quelado	0,02	0,03		
Molibdeno	0,02	0,03		
Zinc EDTA quelado	0,02	0,03		

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Maxifrut® es un producto completo, enriquecido con 8 nutrientes esenciales que actúa sinérgicamente en 3 momentos claves del ciclo del cultivo: floración, cuaja y engorde, para la obtención de una producción con máximos calibres, calidad y rendimientos. Promueve la floración, induce una cuaja homogénea y maximiza el engorde de frutos. Al mismo tiempo, aporta elementos fundamentales para mejorar la acumulación y movilidad de azúcares hacia los frutos, optimizando la maduración y la calidad de los frutos a cosecha. Además, promueve la acumulación de sustancias de reserva, indispensables para una óptima brotación en la temporada siguiente.

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### Compatibilidad

Es compatible con la mayoría de los productos. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

### Precauciones

Mantener el producto a condiciones de temperatura y humedad normales de almacenaje.

### Presentación

1, 5 y 20 L

CULTIVO		ÉPOCA DE APLICACIÓN SEGÚN OBJETIVO CUAJA		DOSIS
Hortalizas	Tomate invernadero	Aplicar durante la floración de cada ramillete	Aplicar en floración de cada ramillete floral y repetir desde cuaja cada 7 días	Aplicación foliar: 200 – 300 cc/100 L de agua
	Melón Sandía Zapallo Pepino Tomate a campo abierto Pimiento	Desde inicio de floración cada 7 días	Aplicar desde floración y engorde de frutos en intervalos de 15 días	
Berries	Arándano Frambuesa Frutilla	Desde inicio de floración cada 7-10 días	Desde caída de pétalos cada 7-10 días	Aplicación vía riego: 7 – 11 L/ha por aplicación. Completar 22-29 L/ha por temporada
Frutales	Cerezos Durazneros Nectarinos Ciruelos Manzanos Perales	En inicio y plena flor		
	Vides	En vides con semilla en inicio y plena flor	En vides con y sin semilla, aplicar desde cuaja cada 7- 15 días	
	Kiwis	Desde inicio a plena floración cada 7 días	Desde cuaja cada 15-20 días	
	Paltos Olivos	Desde inicio a plena floración		

Para mayor información contáctese con nosotros, un ingeniero agrónomo lo atenderá.